

2011年6月20日

イーエヌ大塚製薬株式会社

フィトナジオン（ビタミンK）を減量した「ラコール NF 配合経腸用液」および  
「ツインライン NF 配合経腸用液」に関するお知らせ  
（ワルファリン併用時の留意事項）

このたび「ラコール配合経腸用液」および「ツインライン配合経腸用液」は、他の経腸栄養剤と比較してビタミンK含有量が高いため、ビタミンK含有量を他の経腸栄養剤と同程度（約1/10）に減量した新規の製剤を発売することになりました。

新規の製剤は、「ラコール NF 配合経腸用液」および「ツインライン NF 配合経腸用液」です。

経腸栄養剤を変更する場合、特に以下1) 2) の変更に関しては、ビタミンK含有量が異なることにより、ワルファリンとの相互作用に差異が生じる可能性がありますのでご注意ください。

- 1) ビタミン K 低含量の経腸栄養剤から、従来の「ラコール配合経腸用液」および「ツインライン配合経腸用液」に切り替える場合
- 2) ビタミン K 高含量の「ラコール配合経腸用液」および「ツインライン配合経腸用液」から、ビタミンK低含量の「ラコール NF 配合経腸用液」および「ツインライン NF 配合経腸用液」に切り替える場合

ワルファリン使用患者様において経腸栄養剤を切り替える場合、経腸栄養剤のビタミンK含有量をチェックすると共に、ワルファリン投与量の設定に十分ご留意いただきますようお願いいたします。

なお、ビタミンKを減量した「ラコール NF 配合経腸用液」および「ツインライン NF 配合経腸用液」の〔効能・効果〕、〔用法・用量〕、ビタミンK以外の栄養成分量は、従来の「ラコール配合経腸用液」および「ツインライン配合経腸用液」と同一です。

**【お問い合わせ先】**

株大塚製薬工場輸液DIセンター：TEL 0120-719-814 または 03-5298-3200