

『新版 がん緩和ケアガイドブック』正誤表

『新版 がん緩和ケアガイドブック』に誤りがございました。
 謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正いたします。

頁・箇所	誤	正
22頁 WHO方式がん疼痛治療法の5原則 「③WHO ラダーに沿って痛みの強さに応じた薬剤を選択する」の6行目	中等度から強度の痛みに用いるオピオイドから投与する	中等度から 高度 の痛みに用いるオピオイドから投与する
22頁 WHO方式がん疼痛治療法の5原則 「④患者に見合った個別的な量を投与する」の3行目	強度の痛みに用いるオピオイドには「常用量」や「投与量の上限」があるわけではない	高度 の痛みに用いるオピオイドには「常用量」や「投与量の上限」があるわけではない
50頁 処方例1 2行目	オキシコドン徐放性製剤 1日40mg (1回 20mg 1日2回) から1日製剤のフェンタニル貼付薬 (0.3mg/日) に等価換算で変更	オキシコドン徐放性製剤 1日40mg (1回 20mg 1日2回) から1日製剤のフェンタニル貼付薬 (0.6mg /日) に等価換算で変更
50頁 処方例1 図中	フェンタニル貼付薬 (0.3mg/日)	フェンタニル貼付薬 (0.6mg/日)
50頁 処方例2 1行目	1日製剤のフェンタニル貼付薬 (0.3mg/日) からモルヒネ徐放性製剤 1日60mg (1回 30mg 1日2回) に等価換算で変更	1日製剤のフェンタニル貼付薬 (0.6mg /日) からモルヒネ徐放性製剤 1日60mg (1回 30mg 1日2回) に等価換算で変更
50頁 処方例3 2行目	1日製剤のフェンタニル貼付薬 (0.6mg/日) に等価換算で変更	1日製剤のフェンタニル貼付薬 (1.2mg /日) に等価換算で変更
50頁 処方例3 図中左	フェンタニル貼付薬 (0.3mg/日)	フェンタニル貼付薬 (0.6mg/日)
50頁 処方例3 図中右	フェンタニル貼付薬 (0.6mg/日)	フェンタニル貼付薬 (1.2mg /日)
52頁 2行目	フェンタニル貼付薬 0.3mg/日	フェンタニル貼付薬 0.6mg /日

(2017. 11. 24 作成)